

# CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé

Chlorhydrate de moxisylyte

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé ?
3. COMMENT PRENDRE CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE CARLYTENE 30 MG, COMPRIMÉ ENROBÉ ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

VASODILATEUR PERIPHERIQUE

(C: Système cardio-vasculaire)

Ce médicament est indiqué dans:

- les troubles neurologiques mineurs liés au vieillissement,
- le Syndrome de Raynaud (trouble circulatoire des extrémités).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CARLYTENE 30 MG, COMPRIMÉ ENROBÉ ?

**N'utilisez jamais CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé dans les cas suivants:**

- en cas d'antécédents d'allergie au moxisylyte ou à l'un des composants du comprimé.

*EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN*

**Faites attention avec CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé:**

**Mises en gardes spéciales**

Il a été observé de rares cas d'atteinte du foie, régressive à l'arrêt du traitement, pour des doses supérieures à 90 mg par jour.

Il est donc recommandé de ne pas dépasser la dose de 90 mg soit 3 comprimés par 24 heures.

**Précautions d'emploi**

*EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

**Prise d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**Grossesse et Allaitement**

*D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.*

## 3. COMMENT PRENDRE CARLYTENE 30 MG, COMPRIMÉ ENROBÉ ?

**Posologie**

1 comprimé à 30 mg, matin, midi et soir. Ne pas dépasser 3 comprimés par jour.

*CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE:*

*IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.*

*NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.*

**Mode et voie d'administration**

Voie orale.

Avaler les comprimés sans les croquer avec un verre d'eau.

**Fréquence d'administration**

Prendre le comprimé de préférence au cours des repas.

**Durée du traitement**

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

**Si vous avez utilisé plus de CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé que vous n'auriez dû:**

Un surdosage peut se manifester par de l'hypotension, un priapisme (érection non volontaire du pénis violente et douloureuse), une augmentation des transaminases ou une hépatite.

Si vous avez pris plus de CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé qu'il ne le fallait, veuillez contacter immédiatement votre médecin.

**Si vous avez oublié de prendre CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé:**

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle; ne doublez pas la dose.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Troubles digestifs mineurs (nausées, diarrhée).
- Il a été observé de rares cas d'atteinte du foie, régressive à l'arrêt du traitement, pour des doses supérieures à 90 mg par jour.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr).

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER CARLYTENE 30 MG, COMPRIMÉ ENROBÉ ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

**Que contient CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé ?**

**La substance active est:**

Chlorhydrate de moxisylyte ..... 30,00 mg

Pour un comprimé enrobé.

**Les autres composants sont:**

Lactose, saccharose amylicé, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium, hydroxyalkyléthér de cellulose, suspension opacifiante\* (SEPISPERSE/BLANC AP7001), polyéthylène glycol 6000.

\*Composition de la suspension Opacifiante: dispersion du dioxyde de titane (E 171) dans un mélange eau, polyéthylène glycol, méthylhydroxypropylcellulose.

**Qu'est-ce que CARLYTENE 30 mg, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimé enrobé. Boîte de 32 comprimés enrobés.

**Titulaire**

MEDA PHARMA  
25, BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX  
75016 PARIS

**Exploitant**

MEDA PHARMA  
25, BOULEVARD DE L'AMIRAL BRUIX  
75016 PARIS

**Fabricant**

MEDA MANUFACTURING GMBH  
NEURATHER RING 1  
51063 COLOGNE  
ALLEMAGNE

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 07/08/2015.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).